УДК: 517.938.5+523.947

MSC 2010: 37D15

Сценарий пересоединения в короне Солнца с простой дискретизацией

О. В. Починка, Е. В. Круглов, А. Ю. Долгоносова

В настоящей работе описан и реализован один из возможных сценариев рождения гетероклинических сепараторов в солнечной короне. Предлагаемый сценарий пересоединения связывает магнитное поле с двумя нулевыми точками разного знака, веерные поверхности которых не пересекаются, с магнитным полем с двумя нулевыми точками и двумя гетероклиническими сепараторами, их соединяющими. Метод доказательства заключается в создании модели магнитного поля, создаваемого плазмой в короне Солнца, и исследования ее методами теории динамических систем, а именно: в пространстве векторных полей на сфере S^3 с двумя источниками, двумя стоками и двумя седлами мы строим простую дугу с двумя седло-узловыми бифуркационными точками, соединяющую систему без гетероклинических кривых с системой с двумя гетероклиническими кривыми, причем дискретизация данной дуги также является простой дугой в пространстве диффеоморфизмов. Изложенные результаты являются новыми.

Ключевые слова: пересоединения, сепараторы, бифуркации

Получено 15 октября 2017 года

После доработки 16 ноября 2017 года

Построение сценария выполнено в рамках проекта РНФ 17-11-01041, исследование дискретизации построенной дуги выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований в НИУ ВШЭ в 2017 году (проект 90).

Починка Ольга Витальевна

olga-pochinka@yandex.ru

Долгоносова Анна Юрьевна

adolgonosova@hse.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

603155, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12

Круглов Евгений Валентинович

kruglov19@mail.ru

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23

1. Введение

В серии относительно недавних работ специалистов в области магнитной гидродинамики (МГД) (см., например, [7, 11] и др.) было показано, что такие явления, как вспышки на Солнце и других звездах, суббури в магнитосферах планет, различные эффекты в лабораторной плазме в качестве физической основы имеют пересоединение магнитных силовых линий. Наиболее яркие свидетельства магнитного пересоединения были обнаружены в короне Солнца.

Магнитное пересоединение в трехмерном случае можно описать как изменение состояния плазмы, при котором два элемента плазмы, вначале связанные силовой линией, после перестают быть ею связанными. Точки, в которых магнитное поле равно нулю, называются нейтральными, или нулевыми, точками. Из результатов МГД следует, что с точки зрения теории динамических систем в типичном случае нулевые точки суть трехмерные структурно устойчивые седла, такие, что сумма характеристических чисел данного седла равна нулю. Нулевая точка называется положительной, если среди собственных чисел соответствующего седла одно положительное и два отрицательные (топологический индекс седла равен -1). Нулевая точка называется отрицательной, если среди собственных чисел одно отрицательное и два положительных (топологический индекс равен 1). Одномерную сепаратрису седла в МГД называют шипом, а двумерную сепаратрису — веерной поверхностью.

В ряде случаев процессы пересоединения связаны с появлением и исчезновением так называемых гетероклинических сепараторов — магнитных линий, соединяющих нулевые точки векторного поля и одновременно являющихся пересечением веерных поверхностей. В теории динамических систем такие объекты называют гетероклиническими кривыми. Подробное физическое и математическое описание процессов пересоединения дано в книге [7, с. 233–240]. Более подробно моделирование явлений в плазме методами теории динамических систем описано, например, в работах [3] и [8].

Модель, рассматриваемая в данной статье, имеет следующую структуру. Трехмерную замкнутую ограниченную область магнитного поля, из которой все линии магнитного поля выходят, считают источниковой областью и условно рассматривают как источник. Трехмерную замкнутую ограниченную область магнитного поля, в которую все линии магнитного поля входят, считают стоковой областью и условно рассматривают как сток. Мы будем рассматривать магнитное поле с двумя источниковыми, двумя стоковыми областями и двумя нулевыми точками — положительной и отрицательной, веерные поверхности которых пересекаются не менее чем по одному гетероклиническому сепаратору. Рассмотренная модель с точки зрения теории динамических систем представляет собой поток на сфере S^3 , неблуждающее множество которого состоит в точности из двух источников, двух стоков и двух седел разного топологического индекса.

В настоящей работе описан один из возможных сценариев рождения гетероклинических сепараторов в солнечной короне (см. [1, 5]). В пространстве потоков, обладающих описанными выше свойствами, мы строим простой путь с двумя седло-узловыми бифуркационными точками, соединяющий систему без гетероклинических кривых с системой с двумя гетероклиническими кривыми. Или, в терминологии МГД, нами построен путь, связывающий магнитное поле с двумя нулевыми точками разного знака, веерные поверхности которых не пересекаются, с магнитным полем с двумя нулевыми точками и двумя гетероклиническими сепараторами, их соединяющими. Отметим, что дискретизация такого пути также является простым путем в пространстве соответствующих диффеоморфизмов.

2. Необходимые понятия и факты

Введем необходимые определения, следуя [10]. Пусть M — гладкое замкнутое n -мерное многообразие, $X(M)$ — множество потоков, заданных на многообразии M . Через $MS(M)$ обозначим подмножество потоков Морса–Смейла на M . Дугой (или путем) в пространстве $X(M)$ будем называть отображение

$$\xi: I \rightarrow X(M), \quad \xi \in C^1(I), \quad I = [0, 1].$$

Бифуркационным множеством дуги ξ назовем множество таких точек $\theta \in I$, которым при отображении ξ соответствуют негрубые системы в $X(M)$. Обозначим через F множество всех дуг в $X(M)$. Тогда дуга ξ называется простой, если ее бифуркационное множество конечно и у нее существует такая окрестность U в F , что для любой дуги $\eta \in U$ ее бифуркационное множество эквивалентно бифуркационному множеству дуги ξ .

Два потока $X_1, X_2 \in X(M)$ называются просто связанными, если существует простая дуга ξ , такая, что $\xi(0) = X_1$, $\xi(1) = X_2$.

В работе [6] показано, что любые две системы $X_1, X_2 \in MS(M)$ в множестве потоков Морса–Смейла связаны простой дугой.

В данной работе рассматриваются градиентноподобные потоки, то есть потоки без периодических траекторий. Для таких потоков бифуркационное множество простой дуги включает в себя следующие возможные бифуркации [6, 12]:

- 1) все неподвижные точки гиперболические, кроме одной, для которой выполняется следующее свойство: в точности один корень характеристического уравнения равен нулю, причем вторая частная производная от соответствующей правой части системы дифференциальных уравнений в данной точке отлична от нуля (такие точки относятся к типу «седло-узел»);
- 2) все неподвижные точки гиперболические, устойчивые и неустойчивые многообразия пересекаются трансверсально по всем траекториям, кроме одной.

В работе [2] доказан следующий результат. Пусть X_λ , $\lambda \in [-1, 1]$ — градиентноподобные потоки, заданные на замкнутом гладком многообразии размерности, большей 1, и $\lambda = 0$ — единственная бифуркационная точка типа касание. Тогда потоки X_{-1} , X_1 могут быть связаны другой простой дугой, содержащей две точки бифуркации типа седло-узел. Отсюда следует, что простой путь, соединяющий два потока $X(M)$ (заданных на произвольном замкнутом дифференцируемом многообразии и обладающих двумя седлами различных топологических индексов), имеющий единственную бифуркационную точку типа касание, может быть заменен на простой путь, имеющий две бифуркационные точки типа седло-узел.

3. Формулировка результатов

В данной работе рассматриваются потоки на трехмерной сфере S^3 . Множество всех потоков на сфере S^3 будем обозначать $X(S^3)$. Множество потоков, неблуждающее множество которых состоит в точности из двух источников, двух стоков и двух седловых точек разных топологических индексов, будем обозначать $\mathcal{X}_1(S^3)$. Класс потоков на сфере S^3 , предельное множество которых состоит в точности из трех седел, трех источников (стоковых) и двух стоковых (источниковых) неподвижных точек, обозначим $\mathcal{X}_2(S^3)$.

Теорема 1. В пространстве $X(S^3)$ существует простая дуга $\{f_t \in X(S^3)\}$, такая, что

- 1) $f_0, f_1 \in \mathcal{X}_1(S^3)$ и двумерные многообразия седел потока f_0 не имеют общих точек, а двумерные многообразия седел потока f_1 пересекаются по двум гетероклиническим кривым,
- 2) существуют значения $\mu_1 \in (0, 1)$, $\mu_2 \in (0, 1)$ $\mu_1 < \mu_2$, такие, что $f_t \in \mathcal{X}_1(S^3)$ для всех $t \in [0, \mu_1) \cup (\mu_2, 1]$,
- 3) $f_t \in \mathcal{X}_2(S^3)$ для всех $t \in (\mu_1, \mu_2)$,
- 4) неблуждающее множество потока f_{μ_i} , $i = 1, 2$, состоит из шести гиперболических неподвижных точек (два источника, два стока и два седла) и одной негиперболической неподвижной точки типа седло-узел.

Обозначим через $Diff(S^3)$ множество всех диффеоморфизмов трехмерной сферы S^3 .

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Непосредственно из описания дуги в теореме 1 следует, что дискретизация дуги $\{f_t \in X(S^3)\}$, то есть дуга $\{f_t^1 \in Diff(S^3)\}$, составленная из сдвигов на единицу времени вдоль траекторий потоков дуги f_t , также является простой, что принципиально отличает данный сценарий от известных ранее сценариев пересоединения.

4. Построение простой дуги

Обозначим $\Phi = (x+2)^2 + (y-2+\lambda)^2 + z^2$, $\Theta = (x-2)^2 + (y+2)^2 + z^2$. В пространстве $\mathbb{R}^3$ рассмотрим систему дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{cases} \frac{1}{9}(\Phi - 4)^2 - 1, & \Phi \leq 4, \\ \frac{1}{9}(\Theta - 4)^2 - 1, & \Theta \leq 4, \\ -1, & \Phi > 4 \text{ и } \Theta > 4, \end{cases} \\ \dot{y} &= \begin{cases} \frac{1}{2}(y - 2 + \lambda)(\sin(\frac{\pi}{2}(\Phi - 3)) - 1), & 2 < \Phi \leq 4, \\ -(y - 2 + \lambda), & \Phi \leq 2, \\ -\frac{1}{2}(y + 2)(\sin(\frac{\pi}{2}(\Theta - 3)) - 1), & 2 < \Theta \leq 4, \\ (y + 2), & \Theta \leq 2, \\ 0, & \Phi > 4 \text{ и } \Theta > 4, \end{cases} \\ \dot{z} &= \begin{cases} \frac{1}{2}z(\sin(\frac{\pi}{2}(\Phi - 3)) - 1), & 2 < \Phi \leq 4, \\ -z, & \Phi \leq 2, \\ -\frac{1}{2}z(\sin(\frac{\pi}{2}(\Theta - 3)) - 1), & 2 < \Theta \leq 4, \\ z, & \Theta \leq 2, \\ 0, & \Phi > 4 \text{ и } \Theta > 4. \end{cases} \end{aligned} \quad (4.1)$$

Непосредственно проверяется, что система (4.1) имеет в точности четыре состояния равновесия, а именно: $(3, -2, 0)$ — седло с устойчивыми одномерными сепаратрисами, параллельными оси абсцисс, $(1, -2, 0)$ — неустойчивый узел, $(-3, 2 - \lambda, 0)$ — с неустойчивыми

одномерными сепаратрисами, параллельными оси абсцисс, $(-1, 2 - \lambda, 0)$ — устойчивый узел. Двумерные многообразия седел суть поверхности, расположены таким образом, что при увеличении параметра λ они сближаются; существует такое значение $\lambda = \lambda_0$, при котором поверхности касаются по гетероклинической кривой, а при $\lambda > \lambda_0$ двумерные многообразия пересекаются по двум гетероклиническим кривым.

Обозначим поток, задаваемый системой (4.1), ϕ^t . Очевидно, что он постоянный всюду вне шаров $\Phi \leq 4$ и $\Theta \leq 4$ и совпадает с потоком $\dot{x} = -1$, $\dot{y} = 0$, $\dot{z} = 0$. Состояния равновесия и устойчивые и неустойчивые многообразия седел находятся в цилиндрах $(x - 2)^2 + z^2 \leq 4$ и $(x + 2)^2 + z^2 \leq 4$, причем оба этих цилиндра содержатся в цилиндре $C = \{(x, y, z): x^2 + y^2 + z^2 \leq 16\}$.

Далее мы используем модификацию классической конструкции Черри, которая рассматривалась различными авторами (см., например, книгу [4], работу [9] и др.).

Рассмотрим радиальное векторное поле φ^t в $\mathbb{R}^3$, заданное формулами $\dot{x} = -x$, $\dot{y} = -y$, $\dot{z} = -z$. Множество $K = \{(x, y, z): z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\} \setminus \{(0, 0, 0)\}$ является инвариантным относительно потока φ^t , задаваемого этим векторным полем. Кроме того, существует диффеоморфизм $\eta: C \rightarrow K$, такой, что $\varphi^t|_{\partial K} = \eta\phi^t\eta^{-1}|_{\partial K}$. Обозначим через ψ^t поток на $\mathbb{R}^3$, который совпадает с φ^t вне K и совпадает с $\eta\phi^t\eta^{-1}$ на K . После стандартной компактификации пространства $\mathbb{R}^3$ с добавлением единственной бесконечной точки поток ψ^t перейдет в поток класса $\mathcal{X}(S^3)$ на сфере S^3 .

Таким образом, мы построили гладкую дугу, соединяющую $f_0, f_1 \in \mathcal{X}_1(S^3)$ и имеющую бифуркационную точку типа касания. В этом случае, согласно работе [2], построенная дуга может быть заменена дугой, имеющей вместо одной бифуркационной точки типа касание две бифуркационные точки типа седло-узел. Тогда новая дуга будет искомой гладкой дугой, связывающей потоки $f_0, f_1 \in \mathcal{X}_1(S^3)$, поскольку ее дискретизация является простой дугой.

References

- [1] Browns D. S., Priest E. R. The topological behaviour of stable magnetic separators, *Sol. Phys.*, 1999, vol. 190, pp. 25–33.
- [2] Fleitas G. Replacing tangencies by saddle-nodes, *Bol. Soc. Brasil. Mat.*, 1977, vol. 8, no. 1, pp. 47–51.
- [3] Grines V., Medvedev T., Pochinka O., Zhuzhoma E. On heteroclinic separators of magnetic fields in electrically conducting fluids, *Phys. D*, 2015, vol. 294, pp. 1–5.
- [4] Grines V., Medvedev T., Pochinka O. *Dynamical systems on 2- and 3-manifolds*, Dev. Math., vol. 46, New York: Springer, 2016.
- [5] Haynes A. L., Parnell C. E., Galsgaard K., Priest E. R. Magnetohydrodynamic evolution of magnetic skeletons, *Proc. R. Soc. Lond. Ser. A Math. Phys. Eng. Sci.*, 2007, vol. 463, no. 2080, pp. 1097–1115.
- [6] Newhouse S., Peixoto M. M. There is a simple arc joining any two Morse–Smale flows, in *Trois études en dynamique qualitative*, Asterisque, vol. 31, Paris: Soc. Math. France, 1976, pp. 15–41.
- [7] Priest E. R., Forbes T. G. *Magnetic reconnection: MHD theory and applications*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.
- [8] Zhuzhoma E. V., Medvedev V. S. Birth of separators in magnetic fields, *Dinamicheskie Sistemy*, 2016, vol. 6(34), no. 1, pp. 37–49 (Russian).
- [9] Kruglov E. V., Talanova E. A. On the realization of Morse–Smale diffeomorphisms with heteroclinic curves on a three-dimensional sphere, *Proc. Steklov Inst. Math.*, 2002, no. 1(236), pp. 201–205; see also: *Tr. Mat. Inst. Steklova*, 2002, vol. 236, pp. 212–217.
- [10] Pilyugin S. Yu. Simple connectedness with preservation of the phase diagram, *Differ. Uravn.*, 1979, vol. 15, no. 3, pp. 408–416 (Russian).

- [11] Syrovatskii S.I. Magnetic hydrodynamics, *Uspekhi Fiz. Nauk*, 1957, vol. 62, no. 7, pp. 247–303 (Russian).
- [12] Shilnikov L.P., Shilnikov A.L., Turaev D., Chua L.O. *Methods of qualitative theory in nonlinear dynamics: Part 2*, World Sci. Ser. Nonlinear Sci. Ser. A Monogr. Treatises, vol. 5, River Edge, N.J.: World Sci., 2001.

Scenario of reconnection in the solar corona with a simple discretization

Olga V. Pochinka¹, Evgeniy V. Kruglov², Anna Yu. Dolgonosova³

^{1,3}National Research University Higher School of Economics
ul. Bolshaya Pecherskaya 25/12, Nizhnii Novgorod, 603155, Russia

²Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
pr. Gagarina 23, Nizhnii Novgorod, 603950, Russia

¹olga-pochinka@yandex.ru, ²kruglov19@mail.ru, ³adolgonosova@hse.ru

In this paper, one of the possible scenarios for the creation of heteroclinic separators in the solar corona is described and realized. This reconnection scenario connects the magnetic field with two zero points of different signs, the fan surfaces of which do not intersect, with a magnetic field with two zero points which are connected by two heteroclinic separators. The method of proof is to create a model of the magnetic field produced by the plasma in the solar corona and to study it using the methods of dynamical systems theory. Namely, in the space of vector fields on the sphere S^3 with two sources, two sinks and two saddles, we construct a simple arc with two saddle-node bifurcation points that connects the system without heteroclinic curves to a system with two heteroclinic curves. The discretization of this arc is also a simple arc in the space of diffeomorphisms. The results are new.

MSC 2010: 37D15

Keywords: reconnections, separators, bifurcations

Received October 15, 2017, accepted November 16, 2017

Citation: *Rus. J. Nonlin. Dyn.*, 2017, vol. 13, no. 4, pp. 573–578 (Russian)